



Tabla de anti-inflamatorios usados en el tratamiento de enfermedades discales.

Tratamiento	Dosis en perro	Dosis en gato
Prednisona	0,05 a 0,5 mg/kg/12 h	0,05 a 0,5 mg/kg/12 h
Aspirina	10 a 25 mg/kg/8-12 h	10 mg/kg/72 h
Ketoprofeno	1-2 mg/kg/24 h	0,5 a 1 mg/kg/24 h
Carprofeno	2,2 mg/kg/12 h	No aconsejado
Meloxicam	0,1 a 0,2 mg/kg/24 h	No aconsejado
Etodolac	10 a 15 mg/kg/24 h	No aconsejado
Nimesulida	5 mg/kg/24 h	No establecida
Tepoxalin	10 mg/kg/24 h	No establecida

Tabla de opiáceos usados en la analgesia para enfermedades discales.

Tratamiento	Dosis en perro	Dosis en gato
Buprenorfina	0,01 a 0,02 mg/kg/6-8 h	0,005 a 0,01 mg/kg/6-8 h
Butorfanol	0,2 a 0,4 mg/kg/2-4 h	0,2 a 0,4 mg/kg/2-4 h
Oximorfona	0,05 a 0,1 mg/kg/4-6 h	0,02 a 0,05 mg/kg/4-6 h
Hidromorfona	0,05 a 0,2 mg/kg/ 4-6 h	0,03 a 0,1 mg/kg/ 4-6 h
Morfina	0,05 a 1 mg/kg/4 h	0,05 a 1 mg/kg/4 h
	I.C: 0,1 a 0,5 mg/kg/h	I.C: 0,05 a 0,1 mg/kg/ h
Fentanilo	0,002 a 0,005 mg/kg/1-2 h	0,001 a 0,003 mg/kg/2-4 h
	I.C: 0,003 a 0,006 mg/kg/h	I.C: 0,002 a 0,003 mg/kg/h
	Parches 5-10 kg - 25 mcg/h	Parche: 25 mcg/h
	10-20 kg – 50 mcg/h	
	20-30 kg – 75 mcg/h	
	más de 30 kg – 100 mcg/h	
Codeína	1 a 2 mg/kg/8-12 h	Contraindicada

Tablas extraídas de “A Practical Guide to Canine and Feline Neurology” de Curtis Dewey, Iowa State Press; Blackwell Publishing company, 2003.